

Tabellarische Übersicht der Impfeempfehlungen im Herbst 2022

Übersicht Impfeempfehlung im Herbst 2022 für geimpfte Personen ≥ 16 Jahre

Zielgruppe	Impfstatus	Anzahl Impfdosen gemäss Empfehlung Herbst 22 ¹	Impfstoffe ²	
			Name	Dosierung
BGP (Personen mit chronischen Krankheiten, ≥65 Jahre, Trisomie 21, Schwangere) ab 16 Jahren	Geimpft ³	1 Empfehlungsstärke: +++	Spikevax Bivalent Original/Omicron ²	50 µg
			Nuvaxovid ^{® 2, 4}	5 µg
			Comirnaty [®]	30 µg
			Spikevax [®]	50 µg
Gesundheitspersonal ≥ 16 Jahre, Betreuungspersonen von BGP	Geimpft	1 Empfehlungsstärke: ++	Spikevax Bivalent Original/Omicron ²	50 µg
			Nuvaxovid ^{® 2, 4}	5 µg
			Comirnaty [®]	30 µg
			Spikevax [®]	50 µg
Allgemeine Bevölkerung 16-64 Jahre	Geimpft	1 Empfehlungsstärke: (+)	Spikevax Bivalent Original/Omicron ²	50 µg
			Nuvaxovid ^{® 2, 4}	5 µg
			Comirnaty [®]	30 µg
			Spikevax [®]	50 µg

Übersicht Impfeempfehlung im Herbst 2022 für bisher ungeimpfte Personen ≥ 16 Jahre

Zielgruppe	Impfstatus	Anzahl Impfdosen gemäss Empfehlung Herbst 22 ¹	Impfstoffe	
			Name	Dosierung
BGP (Personen mit chronischen Krankheiten, ≥65 Jahre, Trisomie 21, Schwangere) ab 16 Jahren	Nicht geimpft	2 im Abstand von mind. 4 Wochen	Comirnaty [®]	2x 30 µg
			Nuvaxovid ^{® 4}	2x 5 µg
			Spikevax ^{® 5}	2x 100 µg
			Spikevax Bivalent Original/Omicron ⁶	2x 100 µg
Allgemeine Bevölkerung 16-64 Jahre Inkl. Gesundheitspersonal ≥ 16 Jahre, Betreuungspersonen von BGP	Nicht geimpft	1	Spikevax Bivalent Original/Omicron	50 µg
			Nuvaxovid ^{® 4}	5 µg
			Comirnaty [®]	30 µg
			Spikevax [®]	50 µg
	Nicht geimpft	Alternativ: 2 im Abstand von mind. 4 Wochen	Comirnaty [®]	2 x 30 µg
			Nuvaxovid ^{® 4}	2 x 5 µg
			Spikevax ^{® 5}	2 x 100 µg
			Spikevax Bivalent Original/Omicron ⁶	2 x 100 µg

¹ In jedem Fall muss bei der Auffrischimpfung Herbst 2022 ein **Mindestintervall von 4 Monaten** zur letzten Impfdosis oder möglicherweise vorangehenden Infektion eingehalten werden.

² Wenn verfügbar, wird empfohlen die Auffrischimpfung Herbst 2022 (bei Personen ≥ 16 Jahren die bereits geimpft sind) präferenziell mit einem bivalenten mRNA-Impfstoff oder Nuvaxovid[®] durchzuführen. Diese Impfstoffe, wie auch die monovalenten mRNA-Impfstoffe, sind grundsätzlich geeignet und empfohlen um schwere Infektionen zu verhindern.

³ Die Empfehlung für eine Impfung im Herbst 2022 gilt auch für Personen die bereits eine weitere Auffrischimpfung erhalten haben.

⁴ Die Impfung von Schwangeren und Stillenden mit Nuvaxovid[®] wird aufgrund von bislang noch nicht ausreichend vorhandenen Sicherheitsdaten zurzeit nicht empfohlen.

⁵ Wird mit einem mRNA-Impfstoff geimpft, wird Personen <30 Jahren die Impfung präferenziell mit Comirnaty[®] empfohlen (Grund: Hohe Spikevax[®] Dosierung).

⁶ Nur falls kein monovalenter Impfstoff verfügbar ist, kann alternativ Spikevax Bivalent Original/Omicron verwendet werden. Dazu gibt es jedoch kaum Daten und es entspricht einer off-label Anwendung.



Spezielle Empfehlungssituation: Kinder und Jugendliche im Alter von 5-15 Jahren

Zielgruppe	Impfstatus	Anzahl Impfdosen gemäss Empfehlung Herbst 22 ⁷	Impfstoffe	
			Name	Dosierung
Jugendliche 12-15 Jahre	Geimpft	Keine Impfung	-	-
	Nicht geimpft	Keine Impfung	-	-
		Alternativ: 2 im Abstand von mind. 4 Wochen	Comirnaty ^{®9}	2 x 30 µg
Kinder 5-11 Jahre	Geimpft	Keine Impfung	-	-
	Nicht geimpft	Keine Impfung	-	-
		Alternativ: 2 im Abstand von mind. 4 Wochen	Comirnaty ^{®8}	2 x 10 µg
Jugendliche 12-15 Jahre mit chronischen Krankheiten	Geimpft	Keine Impfung	-	-
	Nicht geimpft	1	Comirnaty ^{®9}	30 µg
		Alternativ: 2 im Abstand von mind. 4 Wochen	Comirnaty ^{®9}	2 x 30 µg
Kinder 5-11 Jahre mit chronischen Krankheiten	Geimpft	Keine Impfung	-	-
	Nicht geimpft	1	Comirnaty ^{®8}	10 µg
		Alternativ: 2 im Abstand von mind. 4 Wochen	Comirnaty ^{®8}	2 x 10 µg

Spezielle Empfehlungssituation: Schwer immundefiziente Personen

Zielgruppe	Impfstatus	Anzahl Impfdosen gemäss Empfehlung Herbst 22 ⁷	Impfstoffe	
			Name	Dosierung
Schwer immundefiziente Personen ≥12 Jahre	Geimpft ³	1	Comirnaty [®]	30 µg
			Spikevax ^{®10}	100 µg
			Spikevax Bivalent Original/Omicron ¹⁰	100 µg ¹¹
	Nicht geimpft	3 + 1	Comirnaty [®]	Je 30 µg
			Spikevax ^{®10}	Je 100 µg
Spikevax Bivalent Original/Omicron ¹⁰			Je 100 µg ¹¹	
Schwer immundefiziente Kinder 5-11 Jahre	Geimpft	Keine Impfung	-	-
	Nicht geimpft	2 + Serologie. Wenn keine Antikörper, 3. Dosis zur Grundimmunisierung	Comirnaty ^{®8}	Je 10 µg

⁷ In jedem Fall muss bei der Auffrischimpfung Herbst 2022 ein **Mindestintervall von 4 Monaten** zur letzten Impfdosis oder möglicherweise vorangehenden Infektion eingehalten werden.

⁸ Zur Anwendung von Spikevax bei wurde keine Empfehlung formuliert, da die zur Verfügung stehenden Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten für diesen Impfstoff in dieser Altersgruppe limitiert sind.

⁹ Wird mit einem mRNA-Impfstoff geimpft, wird die Impfung allen Personen <16 Jahren präferenziell mit Comirnaty[®] empfohlen.

¹⁰ Hier wird Personen <30 Jahren die Impfung präferenziell mit Comirnaty[®] empfohlen (Grund: Hohe Spikevax[®] Dosierung).

¹¹ Nur falls kein monovalenter Impfstoff verfügbar ist, kann alternativ Spikevax Bivalent Original/Omicron verwendet werden. Dazu gibt es jedoch kaum Daten und es entspricht einer off-label Anwendung.