



L'impianto viene posizionato dal/la ginecologo/a grazie ad un applicatore, sotto la cute nella parte interna del braccio, tra il primo e il quinto giorno di mestruazioni.

Impianto sottocutaneo

L'impianto sottocutaneo è un bastoncino flessibile di materiale sintetico della lunghezza di 4 cm e del diametro di 2 mm. Contiene un ormone progestinico che viene rilasciato gradualmente nel sangue, e ha un effetto contraccettivo della durata di 3 anni.

Come agisce

- Impedisce l'ovulazione, senza la quale è impossibile che avvenga la fecondazione.
- Riduce la crescita dell'endometrio, rendendolo inadatto ad un eventuale annidamento.
- Modifica la consistenza del muco cervicale, impedendo il passaggio degli spermatozoi.

Come si usa

L'impianto viene posizionato dal/la ginecologo/a grazie ad un applicatore, sotto la cute nella parte interna del braccio, tra il primo e il quinto giorno di mestruazioni. Prima dell'inserimento e della rimozione viene eseguita un'anestesia locale. L'impianto sottocutaneo non è visibile ma è percepibile al tatto.

Cosa fare se...

Si assumono medicinali: avvisare sempre il CoSS, il/la ginecologo/a o il/la farmacista in quanto ci sono dei principi che annullano l'effetto contraccettivo dell'impianto, viceversa l'impianto modifica l'effetto di alcuni farmaci.

Informazioni importanti

- L'impianto sottocutaneo può provocare delle alterazioni del ciclo mestruale quali: irregolarità mestruale, sanguinamenti tra una mestruazione e l'altra, assenza di mestruazioni.
- L'impianto sottocutaneo può essere rimosso dal/la ginecologo/a in qualsiasi momento.
- Nelle donne con un peso corporeo superiore agli 80 kg, l'efficacia contraccettiva non è garantita durante il terzo anno d'utilizzo.
- L'impianto sottocutaneo è un contraccettivo estremamente efficace.

Per ulteriori informazioni sui contraccettivi ormonali, consultare la pag. 27.